

Protect your child against tetanus, diphtheria and pertussis

For Grade 7 students



Why your child should get the tetanus, diphtheria and pertussis (Tdap) vaccine...

- The Tdap vaccine protects against three diseases: tetanus (lockjaw), diphtheria and pertussis (whooping cough).
- Early childhood vaccines against pertussis (whooping cough) tend to wear off during adolescence.
- To help reduce the incidence of pertussis (whooping cough) in the population and protect babies that are not fully immunized.

Who should get this vaccine?

Grade 7 students.

Who should NOT get this vaccine?

- Individuals allergic to any part of the vaccine or its packaging.

What you should know about tetanus, diphtheria and pertussis disease...

- **Tetanus** is caused by bacteria found in dirt, rust, manure and human feces. An individual becomes infected when bacteria enter an open cut.
- **Diphtheria** is caused by bacteria that infect the nose and throat. These bacteria release a poison that causes the disease symptoms. Diphtheria is spread by coughing and sneezing.
- **Pertussis** is caused by bacteria and begins like or in the same way as a cold. Pertussis is spread by coughing and sneezing.

Possible Symptoms

Tetanus	Diphtheria	Pertussis
<ul style="list-style-type: none"> - muscle spasms - convulsions - sometimes death 	<ul style="list-style-type: none"> - breathing problems - heart failure - paralysis 	<ul style="list-style-type: none"> - severe coughing - choking - whooping cough - vomiting spells (lasting weeks or months) - sometimes death

What you should know about the Tdap vaccine...

The vaccine...

- is **SAFE** and very effective in preventing disease;
- contains three separate vaccinations combined into one needle.

What to expect following tetanus, diphtheria and pertussis immunization...

- **Common side effects** are pain, redness, and swelling at the injection site, mild headache, fever and body aches.

Please note: As is the case with any vaccine, there is a small risk that a serious allergic reaction can occur. **Therefore, students are asked to remain on site for at least 15 minutes after the vaccine is given so that possible immediate reactions can be monitored and treated.**

How to treat fever and pain...

- A cold compress on the injection site may reduce discomfort.
- You may give your child *acetaminophen* (e.g., Tylenol®) or *ibuprofen* (e.g., Advil®).
- *Acetylsalicylic acid* (ASA or Aspirin®) should NOT be given to children younger than 18 due to its link to Reye's syndrome.

What else you should know...

- If your child has a fever or illness other than a minor cold, the nurse may delay giving this vaccine.
- If your child's immune system is affected by illness, steroid medication or cancer treatments, the decision to immunize must be made in consultation with your family physician.
- If your child has had an allergic reaction to a vaccine in the past, or if you have any questions, please contact your local Public Health office.
- Adverse reactions especially severe or unusual reactions in the four weeks following immunization should be reported to the local Public Health office. Please see your doctor if your child has a severe reaction.
- Further information is available at www.gnb.ca/publichealth

Protégez votre enfant contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos

Pour les élèves de 7e année



Pourquoi votre enfant devrait-il recevoir le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (dcaT)?

- Le vaccin dcaT protège contre trois maladies: la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (mâchoire barrée).
- Le vaccin contre la coqueluche (toux coquelucheuse) donné aux jeunes enfants a tendance à perdre son efficacité à l'adolescence.
- Pour aider à réduire l'incidence de coqueluche (toux coquelucheuse) dans le grand public et à protéger les bébés qui ne sont pas complètement immunisés.

Qui devrait se faire vacciner?

Les élèves de 7e année.

Qui ne devrait PAS recevoir ce vaccin?

- Les personnes qui sont allergiques à un des composants du vaccin ou de son contenant.

Ce que vous devriez savoir sur la diphtérie, la coqueluche et le tétanos...

- **La diphtérie** est causée par une bactérie qui déclenche une infection dans le nez et la gorge. Cette bactérie répand un poison à l'origine des symptômes de la maladie. La diphtérie se propage par la toux et les éternuements.
- **La coqueluche** est causée par une bactérie et se manifeste un peu comme un rhume. La maladie se propage par la toux et les éternuements.
- **Le tétanos** est causé par une bactérie qu'on trouve dans la terre, dans la rouille, dans le fumier et dans les excréments humains. Une personne contracte la maladie lorsque la bactérie s'introduit dans une plaie ouverte.

Symptômes possibles

Diphtérie

- troubles respiratoires
- insuffisance cardiaque
- paralysie

Coqueluche

- toux violente
- étouffement
- toux coquelucheuse
- épisodes de vomissements (pouvant durer des semaines ou des mois)
- mort (dans certains cas)

Tétanos

- spasmes musculaires
- convulsions
- mort (dans certains cas)

Ce que vous devriez savoir sur le vaccin dcaT...

Le vaccin...

- est **SÉCURITAIRE** et très efficace pour la prévention de la maladie;
- comporte trois vaccinations distinctes dans une même seringue.

Ce à quoi s'attendre à la suite du vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos...

- Les **effets secondaires courants** comprennent la douleur, une rougeur et une enflure au site d'injection, des maux de tête légers, de la fièvre et des douleurs musculaires.

À noter : Comme c'est le cas pour tous les vaccins, il y a un faible risque qu'une réaction allergique grave se présente. *Par conséquent, on demande aux élèves de rester sur place pendant au moins 15 minutes après l'administration du vaccin afin que les réactions immédiates possibles puissent être surveillées et traitées.*

Comment soulager la fièvre et la douleur...

- Une compresse froide sur le site d'injection peut aider à diminuer l'inconfort.
- Vous pouvez donner à votre enfant de l'acétaminophène (p. ex. Tylenol®) ou de l'ibuprofène (p. ex. Advil®).
- On ne devrait PAS donner d'acide acétylsalicylique (AAS ou Aspirin®) à un enfant de moins de 18 ans en raison de son lien avec le syndrome de Reye.

Ce que vous devriez savoir également...

- Si votre enfant fait de la fièvre ou a une maladie autre qu'un simple rhume, l'infirmière peut retarder l'administration de ce vaccin.
- Si le système immunitaire de votre enfant est affaibli par une maladie, une médication aux stéroïdes ou des traitements contre le cancer, la décision d'immuniser doit être prise en consultation avec votre médecin de famille.
- Si votre enfant a déjà fait une réaction allergique à un vaccin, ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre bureau local de Santé publique.
- Les effets indésirables ou les réactions inhabituelles ou particulièrement graves survenant dans les quatre semaines suivant l'immunisation devraient être signalés au bureau local de Santé publique. Veuillez consulter votre médecin si votre enfant fait une réaction grave.
- De plus amples renseignements sont affichés en ligne à l'adresse www.gnb.ca/santépublique